

Пролонгированная ревитализация кожи препаратами Advance - протокол Advance Hydro

В клинической практике применяется 4 основных протокола применения препаратов:

- Hydro для восстановления гидрорезерва и длительного увлажнения кожи.
- Lift для создания мгновенного эффекта лифтинга.
- Tight для уплотнения кожи и восстановления коллагеновой структуры дермы.
- Fill для создания эффекта филлинга и восполнения дефицита ПЖК.

В зависимости от показаний и задач специалист может комбинировать разные протоколы при работе с пациентом. В рамках данного мастер-класса мы представим протокол Advance Hydro.

Протокол ADVANCE HYDRO

1 этап: разметка

- Зоны коррекции: средняя и нижняя треть лица
- Расстояние между вколами составляет 1 см см.



2 этап: введение препарата

- Расходные материалы: препарат ADVANCE MEDIUM 1 иглы 29G 5mm
- Техника введения: препарат вводится в микрокапельной технике. Глубина введения – 5мм. Объем препарата на 1 вкол – 0.01 мл. Вкол осуществляется под углом 90 градусов .
- Advance Medium вводится строго на субдермальном слое, без визуализации препарата



ml ,

3 этап: легкий массаж в зоне коррекции



Advance - многопрофильные препараты с инновационными физико-химическими свойствами. Применение препаратов ADVANCE позволяет выполнить длительную ревитализацию кожи, реструктуризацию и филлинг тканей в рамках 1 процедуры. Линия ADVANCE включает 2 препарата: ADVANCE MEDIUM с концентрацией ГК 25мг/мл (рис 1) и ADVANCE STRONG с концентрацией ГК 30 мг/мл (рис 2). Запатентованный метод производства состоит из 2 этапов: частичной стабилизации молекул ГК с помощью дивинилсульфона и физической микронизации.



Характеристики препаратов Advance

ADVANCE MEDIUM	ADVANCE STRONG
<ul style="list-style-type: none">• Концентрация – 25 мг/мл<ul style="list-style-type: none">• Содержание эндотоксинов <0,0001 мг/мл.• В упаковке 1 стеклянный шприц с 2 иглами 27G, объем 1 мл.• Уровень введения: субдермальный слой.• Продолжительность эффекта: 6-8 месяцев	<ul style="list-style-type: none">• Концентрация – 30 мг/мл• Содержание эндотоксинов <0,0001 мг/мл.• В упаковке 1 стеклянный шприц с 2 иглами 27G, объем 1 мл.• Уровень введения: субдермальный слой.• Продолжительность эффекта: 6-8 месяцев

За счет физико-химических препараты ADVANCE имеют:

- Высокую пластичность при высокой концентрации ГК
- Длительный период биodeградации в течение 6-8 месяцев
- Высокую гидратационную способность.

Особенности химического строения препаратов Advance определяют несколько механизмов действия на ткани: присоединение и удерживание молекул воды, активацию процессов неокollaгенеза и восполнение объема дефицита пжк .

Данные свойства препаратов Advance обеспечивают широкий перечень клинических показаний и зон коррекции.

<ul style="list-style-type: none">• Снижение тургора кожи• Возрастная атрофия кожи• Эпидермально-дермальные заломы• Выраженное истончение и дряблость кожи лица и тела• Тонкая сухая кожа• Обезвоженная кожа• Носогубные и губоподбородочные складки• Дефицит подкожно-жировой клетчатки	<ul style="list-style-type: none">• Средняя и нижняя треть лица• Шея и декольте• Кисти рук• Внутренняя поверхность плеча• Внутренняя поверхность бедра• Область живота• Ягодицы
---	---

Подробнее о препарате

<https://www.balancemedesthetic.ru/magazin/konturnaya-plastika/>